

Resistenzstatistiken - Jahresüberblick

Erregerisolate aus dem niedergelassenen Bereich
Orale Antibiotika

u. a. Wundinfektion

	b-hämolyt. Streptokokken				Staph. aureus
	Gr. A	Gr. B	Gr. C	Gr. G	
Penicillin G	0%	0%	0%	0%	75%
Oxacillin					3%
Ampicillin	0%	0%	0%	0%	75%
Amoxi/Clavulans.	0%	0%	0%	0%	3%
Cephaclor	0%	0%	0%	0%	3%
Cefuroxim	0%	0%	0%	0%	3%
Cefpodoxim	0%	0%	0%	0%	3%
Tetracyclin	4%	64%	6%	20%	2%
Erythromycin	4%	25%	9%	17%	14%
Clindamycin	3%	25%	6%	12%	11%
Ciprofloxacin	100%	100%	100%	100%	
Levofloxacin	0%	1%	1%	2%	5%
Moxifloxacin	0%	1%	0%	0%	4%
TMP-SXT	1%	0%	1%	1%	1%
Getestete Isolate	1844	1550	265	250	6479

MRSA-Rate: 3 % (ohne MRSA-Screening-Proben)

u. a. Infektionen Respirationstrakt

	Streptoc. pneumon.	Haemoph. influenz.	Moraxella catarrhalis	Pseudom. aeruginosa
Penicillin G	1%			
Oxacillin				
Ampicillin	1%	28%	100%	100%
Amoxi/Clavulans.	1%	15%	9%	100%
Cephaclor		100%	100%	100%
Cefuroxim	0%			100%
Cefpodoxim		0%	0%	100%
Tetracyclin	7%	0%	1%	100%
Erythromycin	6%			
Clindamycin	4%	100%	100%	
Ciprofloxacin		0%	1%	7%
Levofloxacin	0%	0%	0%	9%
Moxifloxacin	0%	0%	0%	
TMP-SXT	4%	9%	3%	100%
Getestete Isolate	283	1573	294	1783

Legende

- < 1% der Isolate resistent
- 1-5% der Isolate resistent
- 6-10% der Isolate resistent
- 11-20% der Isolate resistent
- 21-30% der Isolate resistent
- >30% der Isolate resistent
- Kombination nicht getestet, z. B. bei intrinsischer Resistenz

Auswertung

- Patientenbereinigt: nur ein Erreger pro Patient pro Vierteljahr
- „Intermediär“ wird als „sensibel“ gewertet.
- Zugrundeliegende Testnorm: EUCAST

Ansprechpartner

PD Dr. med. Roggenkamp
Dr. med. Bernhard Wiegel
Fr. Cynthia Beisert-Carneiro
Hr. Frank Wiedemann
Tel: 0851 - 95 93 00

Harnwegsinfektionen

	Escherich coli	Proteus spp.	Klebsiella spp.	Staph. saprophyt.	Enteroc. faecalis		Neisseria gonorrhoeae
Ampicillin	34%	48%	100%	98%	0%	Penicillin G	40%
Amoxi/Clavulans.	10%	26%	11%	1%	0%	Cefpodoxim	0%
Mecillinam	2%	25%	4%	100%	100%	Ciprofloxacin	67%
Cepodoxim	6%	7%	6%	1%	100%	Tetracyclin	72%
TMP-SXT	19%	31%	12%	1%		Azithromycin	7%
TMP	20%	36%	12%	2%			
Ciprofloxacin	8%	10%	4%	1%	2%		
Nitrofurantoin	2%			22%	30%		
Nitroxolin	1%						
Fosfomycin (p.o.)	1%						
Getestete Isolate	16853	2193	3098	468	2595		48